



子どもの予防接種


〈保健センターで実施〉

種類	会場・日程	受付時間	対象	備考
BCG予防接種	佐屋 2月27日(木) 佐織 1月27日(月)	午後1時50分～2時20分	1歳に至るまで 〈標準的な接種期間〉 生後5か月以上8か月未満	※5日前までに予約が必要

〈医療機関で実施〉

種類	対象	予診票の配布について
ヒブ感染症	生後2か月～60か月に至るまで	生後2か月までの方に郵送
小児の肺炎球菌感染症	生後2か月～60か月に至るまで	
4種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)	生後3か月～7歳6か月に至るまで	
3種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風)	生後3か月～7歳6か月に至るまで	10か月児相談で配布
不活化ポリオ	生後3か月～7歳6か月に至るまで	
2種混合 (ジフテリア・破傷風)	11歳以上13歳未満	小学校6年生の方に郵送
麻しん及び風しん (MR混合)	1期 1歳～2歳に至るまで	10か月児相談の案内に同封
	2期 5歳以上7歳未満で、小学校就学前1年間	対象の方に郵送
日本脳炎	1期 3歳～7歳6か月未満	3歳児健康診査で配布
	2期 9歳以上13歳未満	予診票は市内指定医療機関に置いてありますが、市外で接種を希望される方は保健センターにお問い合わせください。
※平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれの方は、対象年齢外であっても接種が可能です。 詳しくは保健センターへお問い合わせください。		
子宮頸がん	小学校6年生～高校1年生の女子 ◎現在は、子宮頸がん予防ワクチンの接種を積極的にお勧めしていません。接種にあたっては、有効性とリスクを理解した上で受けてください。	中学1年生の方に郵送

- 指定医療機関へ必ず予約をしてからお出掛けください
- 持ち物：母子健康手帳・予診票・健康保険証・子ども医療受給者証
- 指定医療機関および接種回数、接種間隔等については、予診票と一緒にお渡しする案内をご確認ください
- 詳しくは、「平成25年度愛西市予防接種日程表」またはホームページをご確認ください。



大人の予防接種

種類	対象	備考
高齢者肺炎球菌ワクチン	70歳以上の方(過去5年以内に高齢者肺炎球菌ワクチンを接種していない方)	生涯1回に限り3,000円を助成します。 事前に保健センターで申請が必要です。
風しん	①市内在住で妊娠を予定または希望している女性 ②上記①の夫(同居している内縁の夫を含む)	麻しん風しんワクチンは5,000円、風しんワクチンは3,000円を助成します。事前に保健センターで申請が必要です。



歯の健康講座 第106回

「神経を取った歯なのにどうして痛みが出るのですか？」

そもそも神経の治療って何でしょうか？

歯の中央には洞窟のような管(根管)があり、神経は血管などととも根の先からのみ入り込んでいます。むし歯が深くなり神経に炎症が起きると、身体他の部分とは違い血行不良からすぐ回復不可能になってしまいます。よって除去しなくてはならないのです。そして根管の中でこの内側をトンネルのように形成し、消毒を繰り返し密封する薬を詰めるまでが神経の治療です。神経を取って間もないときは、取った後の傷が歯の根の先にあり、噛むと響く痛みがあったり自発的な鈍痛が出ることもあります。清掃消毒を繰り返して日数が経つと症状はなくなっていきます。神経は、曲がったり枝分かれしている場合もあり、一部の神経が残り痛みが出ていることもあります。

この場合、残っているというのは歯科医の技術の問題ではなく、器具が届かないような形状をしているのです。対応としては神経を殺す薬を使用したり、器具が入る部分を清掃消毒し続けるうちに残りの神経が不活化して症状が消えるのを待ちます。

神経を取り被せものがしてある歯においても、期間が経ってから痛みが出てくることがあります。被せてあっても歯茎のそばに根が僅かに露出しています。清掃状態が悪ければ再びむし歯が出来て、歯の根の先に菌が到達し周囲の炎症となれば痛みが出てきます。膿が多くなると強く痛むこともあります。また歯周病や、食いしばりなどの圧力、根の破折で痛むこともあります。いずれにしても、**神経がない歯というのは歯の中の神経がないということであり、歯の周囲の骨や歯茎にはどこにも神経が巡っています。歯の周囲に炎症が起これば歯の痛みは出るのです。**痛みが続くと辛いとは思いますが、歯科医に任せて根気よく治療を受けてほしいと思います。(海部歯科医師会)